

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-3-67 62525

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE (78) 31 20-56

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

25F.  ABONNEMENT ANNUEL

15 F

16 mars 1967

page 8

INFORMATIONS

V I G N E

ERINOSE- ACARIOSE - Un traitement soufré (soufre micronisé, bouillie sulfocalcique ou sulfures alcalins) appliqué au débourrement permet de lutter à la fois contre l'acariose (pousses retardées, rabougries, peu productives) et l'érinose (sur feuilles, cloques garnies d'un épais duvet blanc, rose ou brun à la face inférieure).

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les traitements appliqués avant les pluies des 9 et 10 devront être renouvelés d'urgence. Ceux qui ont été appliqués depuis ces pluies devront l'être au bout de 9 jours environ en raison de la rapidité de la végétation et du risque persistant de contaminations. Dans les régions plus tardives, le premier traitement sera appliqué à l'apparition des boutons floraux (stade C3).

TAVELURE DU POMMIER - En raison de l'évolution au contraire très lente de la tavelure du pommier, le premier traitement ne s'impose pas encore. Toutefois, on doit l'envisager dès après la prochaine période pluvieuse à l'est d'une ligne Coligny-Ambérieu-Bourgoin-St Vallier-St Agrève-St Laurent les Bains, ou du moins dans les parties basses de cette zone. Un bulletin ultérieur le confirmera.

CECIDOMYIE DES POIRES - Dans les vergers où des poires "calebassées" ont été observées en assez grand nombre au cours des années précédentes, on adjoindra un insecticide approprié (D.D.T. ou H.C.H. à 100gr/hl de matière active ou Lindane à 12gr/hl de m.a.) au traitement dirigé contre la tavelure.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Au retour du temps doux, reprendre la protection.

PSYLLE DU POIRIER - On profitera également du traitement fongicide pour contrôler par un insecticide (H.C.H., Lindane, Dieldrine, Demeton ou, principalement par temps chaud, Parathion ou Diazinon) ce ravageur déjà très actif.

Rappel d'applications conseillées par le bulletin précédent:

- teigne du cerisier (régions tardives)
- phytopte du cerisier (à l'apparition du bouton floral)
- xylébore (à la prochaine période chaude)

CULTURES DIVERSES

OIDIUM SUR CASSISSIER - ROUILLE DU FRAMBOISIER - Contre ces deux maladies, il convient d'intervenir dès maintenant; contre l'oïdium, à l'aide d'un soufre micronisé, contre la rouille à l'aide d'un fongicide de synthèse.

Rappel de conseils antérieurs (bulletin du 8 mars)

- mélégèthe du colza (avant la floraison)
- cécidomyie de la lavande (au stade sensible)

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A. PITHILOUD

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P. LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L. BOUYX

76